

## 【利用判断基準】

### ◎利用可能な判断基準

発熱	38.5 度以下の発熱 水分摂取・食事摂取可能 機嫌が良好である ※新型コロナウイルス感染症の検査（PCR 検査）が陰性であり、濃厚接触者に該当しないこと
下痢	水分摂取可能 機嫌が良好である ※便回数・量要相談
嘔吐	感染性がない 機嫌が良好である 食欲があり、水分摂取可能
咳	食事・水分摂取可能
発疹	出現から 24 時間以上経過している
とびひ	患部を覆うことができる 患部からの浸出液が多くない

### 受け入れ対象となる感染症とその許可基準

風疹	発疹の消失後
水痘	すべての発疹が痂皮化している
流行性耳下腺炎	耳下腺・顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現して 4 日経過かつ全身状態が良好
インフルエンザ	発症後 4 日経過している
マイコプラズマ感染症	抗菌薬を内服している
溶連菌感染症	有効な抗生剤を内服開始している
アデノウイルス感染症	※発熱・下痢・嘔吐の許可基準参考
ヘルパンギーナ	水分摂取ができる
ロタウイルス・ノロウイルス胃腸炎	※発熱・下痢・嘔吐の利用許可基準参考
咽頭結膜熱（プール熱）	目ヤニが消失している（充血は可）
流行性格結膜炎	症状が発熱のみ
RS ウイルス感染症	解熱後 24 時間経過している
ヒトメタニューロウイルス感染症	水分摂取ができ咳がひどくない

※お子様の状態によっては対象内であっても受け入れをお断りする場合があります。